

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регистрационное удостоверение ЛП-003511

Дата регистрации 18.03.2016

Федеральное государственное автономное научное учреждение
«Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита)),
Россия

117218, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Кржижановского, д. 29, к. 5, этаж 3, пом. I, ком. № 6

Инструкция ЛП-003511-100818

БиВак полио (Вакцина полиомиелитная пероральная, двухвалентная, живая аттенуированная 1, 3 типов)
(торговое наименование лекарственного препарата)

раствор для приема внутрь, 0,2 мл/доза
(лекарственная форма, дозировка)

Изменение № 5

Дата внесения Изменения _____

280722

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Внимание! Вакцина предназначена только для перорального применения. Вакцину применяют по 4 капли на прием. Прививочную дозу вакцины закапывают в рот прилагаемой к флакону капельницей или пипеткой за 1 час до еды. Запивать вакцину водой или какой-либо другой жидкостью, а также есть или пить в течение часа после прививки не разрешается. В соответствии с действующей редакцией Национального календаря профилактических	Способ применения и дозы Внимание! Вакцина предназначена только для перорального применения. Вакцину применяют по 4 капли на прием. Прививочную дозу вакцины закапывают в рот прилагаемой к флакону капельницей или пипеткой за 1 час до еды. Запивать вакцину водой или какой-либо другой жидкостью, а также есть или пить в течение часа после прививки не разрешается. В соответствии с действующей редакцией Национального календаря профилактических

Старая редакция		Новая редакция																																																																	
<p>прививок первая и вторая вакцинация против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита инактивированной (ИПВ), в соответствии с инструкцией по применению ИПВ.</p> <p>Третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся детям вакциной для профилактики полиомиелита живой пероральной (ППВ).</p> <p>Три первые прививки составляют курс вакцинации.</p>		<p>прививок первая, вторая, третья вакцинации против полиомиелита детям 3 месяцев, 4,5 месяцев, 6 месяцев жизни и первая ревакцинация против полиомиелита детям 18 месяцев жизни проводятся вакциной для профилактики полиомиелита инактивированной (ИПВ), в соответствии с инструкцией по применению ИПВ.</p> <p>Вторая и третья ревакцинации против полиомиелита детям 20 месяцев и 6 лет проводятся вакциной для профилактики полиомиелита живой пероральной (ППВ).</p> <p>Три первые прививки составляют курс вакцинации.</p>																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4"></th> <th colspan="6">Прививки</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Вакцинация</th> <th colspan="3">Ревакцинация</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ИПВ</th> <th>ППВ</th> <th colspan="3">ППВ</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3*</th> <th>4*</th> <th>5*</th> <th>6*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Возраст ребенка</td> <td>3 мес</td> <td>4,5 мес</td> <td>6 мес</td> <td>18 мес</td> <td>20 мес</td> <td>14 лет</td> </tr> </tbody> </table>			Прививки						Вакцинация			Ревакцинация			ИПВ		ППВ	ППВ			1	2	3*	4*	5*	6*	Возраст ребенка	3 мес	4,5 мес	6 мес	18 мес	20 мес	14 лет	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4"></th> <th colspan="6">Прививки</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Вакцинация</th> <th colspan="3">Ревакцинация</th> </tr> <tr> <th colspan="3">ИПВ</th> <th>ИПВ</th> <th colspan="2">ППВ</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5*</th> <th>6*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Возраст ребенка</td> <td>3 мес</td> <td>4,5 мес</td> <td>6 мес</td> <td>18 мес</td> <td>20 мес</td> <td>6 лет</td> </tr> </tbody> </table>			Прививки						Вакцинация			Ревакцинация			ИПВ			ИПВ	ППВ		1	2	3	4	5*	6*	Возраст ребенка	3 мес	4,5 мес	6 мес	18 мес	20 мес	6 лет
	Прививки																																																																		
	Вакцинация			Ревакцинация																																																															
	ИПВ		ППВ	ППВ																																																															
	1	2	3*	4*	5*	6*																																																													
Возраст ребенка	3 мес	4,5 мес	6 мес	18 мес	20 мес	14 лет																																																													
	Прививки																																																																		
	Вакцинация			Ревакцинация																																																															
	ИПВ			ИПВ	ППВ																																																														
	1	2	3	4	5*	6*																																																													
Возраст ребенка	3 мес	4,5 мес	6 мес	18 мес	20 мес	6 лет																																																													
<p>* детям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недоношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка) – третья вакцинация и последующие ревакцинации против полиомиелита проводятся вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).</p>		<p>* дети, относящиеся к группе риска (с болезнями нервной системы, иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию; дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией; дети с ВИЧ-инфекцией; недоношенные и маловесные дети; дети, находящиеся в домах ребенка) подлежат второй и третьей ре-</p>																																																																	

Старая редакция	Новая редакция
<p>Детям более старшего возраста, не получившим прививки против полиомиелита в установленные сроки, плановая иммунизация проводится по той же схеме (первая и вторая вакцинация – ИПВ, третья вакцинация и последующие ревакцинации – ППВ).</p> <p>Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих вакцинации, сроки, порядок и кратность ее проведения.</p>	<p>вакцинации против полиомиелита в 20 месяцев и 6 лет вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).</p> <p>Детям более старшего возраста, не получившим прививки против полиомиелита в установленные сроки, плановая иммунизация проводится по той же схеме (первая, вторая, третья вакцинации и первая ревакцинация – ИПВ, вторая и третья ревакцинации – ППВ).</p> <p>Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации, которым определяется возраст детей, подлежащих вакцинации, сроки, порядок и кратность ее проведения.</p>

Первый заместитель
генерального директора ФГАНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)




А.Ю. Афонин