

Флю-М [Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная]

раствор для внутримышечного введения

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин
 и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов»
 Федерального медико-биологического агентства
 (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России), Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «_____» 200821 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Форма выпуска. Раствор для внутримышечного введения – по 0,5 мл (1 доза) препарата с консервантом или без консерванта в ампулы из прозрачного стекла. По 5,0 мл (10 доз) препарата с консервантом во флаконы из прозрачного стекла.</p> <p>По 10 ампул в коробке (пачке) из картона для потребительской тары вместе с инструкцией по применению и скарификатором. Коробки (пачки) оклеивают этикеткой-бандеролью.</p> <p>По 10 ампул в контурной ячейковой упаковке из картона упаковочного.</p>	<p>Форма выпуска. Раствор для внутримышечного введения.</p> <p><i>Ампулы</i></p> <p>По 0,5 мл (1 доза) препарата с консервантом или без консерванта в ампулы из прозрачного стекла.</p> <p>По 10 ампул в коробке (пачке) из картона для потребительской тары вместе с инструкцией по применению и скарификатором. Коробки (пачки) оклеивают этикеткой-бандеролью;</p> <p>или по 10 ампул в контурной ячейковой упаковке из картона упаковочного. По 1 контурной ячейковой упаковке в коробке (пачке) из картона для</p>

Изменение № 3 к инструкции ЛП-004760-290318 С. 2

<p>По 1 контурной ячейковой упаковке в коробке (пачке) из картона для потребительской тары вместе с инструкцией по применению и скарификатором.</p> <p>При упаковке ампул с насечкой или кольцом излома, или точкой для вскрытия скарификатор не вкладывают.</p> <p>По 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке из картона упаковочного.</p> <p>По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с 5 флаконами в коробке (пачке) из картона для потребительской тары вместе с инструкцией по применению.</p>	<p>потребительской тары вместе с инструкцией по применению и скарификатором.</p> <p>При упаковке ампул с насечкой или кольцом излома, или точкой для вскрытия скарификатор не вкладывают.</p> <p>Флаконы</p> <p>По 0,5 мл (1 доза) или 5,0 мл (10 доз) препарата с консервантом во флаконы из прозрачного стекла.</p> <p>По 10 флаконов по 0,5 мл или по 5,0 мл в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.</p> <p>По 1 контурной ячейковой упаковке в коробке (пачке) из картона для потребительской тары вместе с инструкцией по применению;</p> <p>или по 5 флаконов по 5,0 мл в контурной ячейковой упаковке из картона упаковочного.</p> <p>По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с 5 флаконами в коробке (пачке) из картона для потребительской тары вместе с инструкцией по применению.</p>
<p>Условия транспортирования.</p> <p>В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 при температуре от 2 до 8 °С. Не</p>	<p>Условия транспортирования.</p> <p>При температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать!</p> <p>Допускается</p>

Изменение № 3 к инструкции ЛП-004760-290318 С. 3

замораживать!	Допускается транспортирование при температуре до 25 °C в течение 6 часов.
---------------	---

Врио директора ФГУП СПбНИИВС ФМБА России

А.Э. Евтушенко

