

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Вакцина коревая культивированная живая

Вакцина для профилактики кори

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » 270417 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Показания к применению.</p> <p>Плановая и экстренная профилактика кори.</p> <p>Плановые прививки проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью.</p> <p>Детей, родившихся от серонегативных к вирусу кори матерей, вакцинируют в возрасте 8 мес и далее – в 14-15 мес и 6 лет. Интервал между вакцинацией и повторной прививкой должен быть не менее 6 мес.</p> <p>Дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), не привитые ранее, не имеющие сведе-</p>	<p>Показания к применению.</p> <p>Плановая и экстренная профилактика кори.</p> <p>Плановые прививки проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью.</p> <p>Детей, родившихся от серонегативных к вирусу кори матерей, вакцинируют в возрасте 8 мес и далее – в 14-15 мес и 6 лет. Интервал между вакцинацией и повторной прививкой должен быть не менее 6 мес.</p> <p>Дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведе-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ний о прививках против кори не болевшие корью ранее вакцинируются в соответствии с инструкцией по применению двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.</p> <p>Экстренную профилактику проводят контактным лицам без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитым. При отсутствии противопоказаний вакцину вводят не позднее, чем через 72 ч после контакта с больным.</p>	<p>ний о прививках против кори, не болевшие корью ранее; взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, не болевшие корью ранее вакцинируются в соответствии с инструкцией по применению двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.</p> <p>Экстренную профилактику проводят контактным лицам без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактичес-</p>

Изменение № 2 к Инструкции по применению С. 3

Старая редакция	Новая редакция
	ких прививках против кори или однократно привитым. При отсутствии противопоказаний вакцину вводят не позднее, чем через 72 ч после контакта с больным.

Исполнительный директор
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России

О.В. Черничук



16.06.2015
01 МИКРОГЕН
67 106СМН
01 МИКРОГЕН
16.06.2015