

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Вакцина паротитно-коревая культуральная живая

Вакцина для профилактики кори и паротита

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

АО «НПО «Микроген»

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 30 12 19 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав. Одна прививочная доза препарата содержит:</p> <p><u>Действующие вещества:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - вирус кори - не менее 1 000 (3,0 lg) тканевых цитопатогенных доз (ТЦД₅₀); - вирус паротита - не менее 20 000 (4,3 lg) ТЦД₅₀. <p><u>Вспомогательные вещества:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стабилизатор - смесь 0,08 мл водного раствора ЛС-18* и 0,02 мл 10 % раствора желатина; - гентамицина сульфат - не более 20 мкг. <p>Примечание. *Состав водного раствора ЛС-18: сахароза – 250 мг, лактоза – 50 мг, натрий глутаминовокислый – 37,5 мг,</p>	<p>Состав. Одна прививочная доза препарата содержит:</p> <p><u>Действующие вещества:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - вирус кори - не менее 1 000 (3,0 lg) тканевых цитопатогенных доз (ТЦД₅₀); - вирус паротита - не менее 20 000 (4,3 lg) ТЦД₅₀. <p><u>Вспомогательные вещества:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стабилизатор - смесь 0,08 мл водного раствора ЛС-18* и 0,02 мл 10 % раствора желатина; - гентамицина сульфат** - не более 0,5 мкг. <p>Примечание. *Состав водного раствора ЛС-18: сахароза – 250 мг, лактоза – 50 мг, натрий глутаминовокислый – 37,5 мг,</p>

Изменение № 2 к Инструкции по применению С. 2

Старая редакция	Новая редакция
глицин – 25 мг, L-пролин – 25 мг, Хенкса сухая смесь с феноловым красным – 7,15 мг, вода для инъекций до 1 мл.	глицин – 25 мг, L-пролин – 25 мг, Хенкса сухая смесь с феноловым красным – 7,15 мг, вода для инъекций до 1 мл. ** Технологическая примесь.

Исполнительный директор
АО «НПО «Микроген»

О.В. Черничук

