

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА**

**Вакцина желтой лихорадки живая сухая,**

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения,

0,5 мл/доза

**ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», Россия**

Изменение № 2


300620

Дата внесения Изменения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p><b>Форма выпуска</b>            Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,5 мл/доза.            Вакцина выпускается в комплекте с растворителем, упаковывается в разные пачки.            Вакцина в ампулах по 2 дозы, 5 доз или 10 доз, 10 ампул в пачке, инструкция по применению и нож ампульный при необходимости;            растворитель (вода для инъекций) в ампулах по 1,25 мл, 3,0 мл и 6,0 мл соответственно. 10 ампул в пачке, нож ампульный при необходимости.</p>	<p><b>Форма выпуска</b>            Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,5 мл/доза.            Вакцина выпускается в комплекте с растворителем в 2-х вариантах.  <b>Вариант №1</b>            (раздельный, вакцина и растворитель упаковываются в разные пачки):            Вакцина в ампулах по 2 дозы, 5 доз или 10 доз, 10 ампул в пачке, инструкция по применению и нож ампульный при необходимости;            растворитель (вода для инъекций) в ампулах по 1,25 мл, 3,0 мл и 6,0 мл соответственно. 10 ампул в пачке, нож ампульный при необходимости.  <b>Вариант №2</b>            (совместный, вакцина и растворитель упаковываются в одну пачку):            Вакцина по 2 дозы - 5 ампул, растворитель (вода для инъекций) - 5 ампул по 1,25 мл в пачке с инструкцией по применению и ножом ампульным при необходимости.</p>
<p><b>Условия хранения</b>            В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 хранить при температуре от 2 до 8 °С.            Растворитель хранить при температуре от 2 до 25 °С.            Хранить в недоступном для детей месте.</p>	<p><b>Условия хранения</b>  <b>Вариант №1 (раздельный):</b>            В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 вакцину хранят при температуре от 2 до 8 °С.            Растворитель хранят при температуре от 2 до 25 °С.</p>

Старая редакция	Новая редакция
	<p>Вариант №2 (совместный): В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 хранить при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.</p>
<p><b>Условия транспортирования</b> В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 транспортировать вакцину при температуре от 2 до 8 °С. Растворитель транспортировать при температуре от 2 до 25 °С.</p>	<p><b>Условия транспортирования</b> Вариант №1 (раздельный): В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 вакцину транспортируют при температуре от 2 до 8 °С. Растворитель транспортируют при температуре от 2 до 25 °С. Вариант №2 (совместный): В соответствии с СП 3.3.2.3332-16 транспортировать при температуре от 2 до 8 °С.</p>
<p><b>Срок годности</b> Вакцина - 2 года Растворитель - 4 года Не применять препарат по истечении срока годности.</p>	<p><b>Срок годности</b> Вакцина – 2 года Растворитель – 4 года Срок годности комплекта при совместной упаковке (вакцина и растворитель) соответствует наименьшему сроку годности компонента, входящего в комплект. Не применять препарат по истечении срока годности.</p>

Первый заместитель  
генерального директора



А.Ю. Афонин