

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Ацилакт, суппозитории вагинальные**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Ацилакт

**Международное непатентованное название:** лактобактерии ацидофильные&

**Лекарственная форма:** суппозитории вагинальные

Препарат представляет собой микробную массу живых антагонистически активных лактобактерий ацидофильных штаммов *Lactobacillus acidophilus* 100аш, NK<sub>1</sub>, K<sub>3</sub>Ш<sub>24</sub>, лиофилизированную в среде культивирования с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды, сформированную в медицинские суппозитории. Один суппозиторий (1 доза) содержит живых лактобактерий ацидофильных - не менее 10<sup>7</sup>, вспомогательные вещества – жир кондитерский от 75 до 80 %, парафин нефтяной твердый от 5 до 10 %, эмульгатор от 5 до 10 %.

Суппозитории конусообразной или цилиндрической формы, желтовато-серого или разных оттенков бежевого цвета, допускается неоднородность цвета в виде вкраплений или «мраморности», возможно окрашивание кончика суппозитория от бледно-желтого до светло-коричневого цвета, имеют специфический запах кондитерского жира.

**Фармакотерапевтическая группа:** МИБП-эубиотик

**Код АТХ:** G01AX14

**Биологические свойства:** Ацилакт обладает высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микробов, включая стафилококки, энтеропатогенные кишечные палочки, протеи, что определяет корректирующее действие препарата при нарушениях бактериоценоза женских гениталий.

**Назначение:** лечение больных с вагинальными дисбиозами и неспецифическими воспалительными процессами влагалища.

**Показания к применению:**

- неспецифические кольпиты. Назначают как самостоятельное средство или после окончания курса антибактериальной терапии;

- дисбиозы влагалища, в том числе бактериальный вагиноз. Назначают как самостоятельное средство или в комплексной терапии;
- подострые и хронические стадии воспалительных процессов женской половой сферы. Назначают после окончания курса антибактериальной терапии с целью реабилитации;
- гормонально зависимые кольпиты, сенильные и др. Назначают как самостоятельное средство или на фоне специфической гормональной терапии;
- подготовка к плановым гинекологическим операциям с целью профилактики послеоперационных инфекционных осложнений;
- предродовая подготовка беременных группы риска по развитию воспалительных заболеваний с целью профилактики и лечения дисбиоза влагалища;
- в качестве вспомогательного средства в сочетании и после специфической антимикробной, противовирусной и иммуномодулирующей терапии при лечении урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем (гонореи, урогенитального хламидиоза, урогенитального герпеса и др.);

Рекомендуется сочетанное применение суппозиториев и одной из пероральных форм ацилакта.

**Противопоказания:** не установлены.

Не рекомендуется применять при вульвовагинальных кандидозах.

**Способ применения и дозы:** перед интравагинальным введением с суппозитория удаляют упаковочный материал.

При лечении сенильных вагинитов гормональной природы и дисбиозов влагалища препарат применяют по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

При нарушении чистоты вагинального секрета у беременных до III-IV степени препарат применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 и более дней под контролем восстановления чистоты вагинального секрета до I-II степени и исчезновения клинических симптомов.

С целью профилактики гнойно-септических осложнений применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней до предполагаемой операции или родоразрешения.

С целью восстановительной терапии после применения антибиотиков применяют по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс повторяют по назначению врача через 10-20 дней.

**Побочные действия:** не выявлены.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** применение Ацилакт суппозиториев возможно сочетать с одновременным назначением антимикробной,

противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Не рекомендуется одновременное вагинальное применение антибактериальных препаратов с Ацилакт суппозиториями.

**Применение во время беременности и лактации:** лактобактерии являются представителями нормальной микрофлоры человека. Поэтому, препараты, изготовленные на их основе, могут применяться при беременности и в период лактации.

**Особые указания:** препарат не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

**Форма выпуска:** по 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной белого цвета.

По 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона с инструкцией по применению.

**Условия отпуска из аптек:** отпускается без рецепта.

**Срок годности препарата.** 1 год.


**Условия хранения:** препарат хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия транспортирования:** препарат транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10 °С.

**Препарат не пригоден для применения:**

- с истекшим сроком годности;
- без маркировки;
- целостность упаковки которого нарушена;
- с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появление запаха прогорклого жира, деформация суппозитория).

**Рекламации на препарат направлять в** ФГБУ «ГИСК им. Л.А.Тарасевича» Минздравсоцразвития России: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41 тел (499) 241-39-22 и в адрес предприятия производителя ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА» 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 1-я, д. 17, корп. 15, тел/факс: (499) 257-10-90.



Генеральный директор  
ЗАО «ФИРМА «ВИТАФАРМА»



Ю.И. Мордвинцев

6 4 1 3 3